

impfen-info.de Impfkalender 2014/2015 – Welche Impfungen sind empfohlen? Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2014

Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)

Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)

Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)					Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)				Erwachsene (ab 18 Jahre)		
	6 Wochen	2 Monate	U4 3 Monate	4 Monate	U6 11–14 Monate	U7 15–23 Monate	2–4 Jahre	U9 5–6 Jahre	J1 9–14 Jahre	15–17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Tetanus >		G1	G2	G3	G4	N	→	A1	A2		A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie >		G1	G2	G3	G4	N	→	A1	A2		A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis) >		G1	G2	G3	G4	N	→	A1	A2		A ^b	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b) >		G1	G2	G3	G4	N	→					
Kinderlähmung (Poliomyelitis) >		G1	G2	G3	G4	N	→		A		ggf. N	→
Hepatitis B >		G1	G2	G3	G4	N	→					
Pneumokokken >		G1	G2	G3	G4	N						S ^c
Rotaviren >	G1 ^a	G2	(G3)									
Meningokokken C >					G (ab 12 Monaten)		N	→				
Masern >					G1	G2	N	→			S ^d	
Mumps >					3-fach- Impfung MMR	3-fach- Impfung MMR + Windpocken	N	→				
Röteln >							N	→				
Windpocken (Varizellen) >					G1	G2	N	→				
Gebärmutterhalskrebs (HPV) >									♀ G1+G2 ^e	♀ N ^e		
Grippe (Influenza) >					Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere						S (jährlich)	

U Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Kinder
G Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1 – G4)
S Standardimpfung
♀ Impfpfehlung für Mädchen und junge Frauen

J Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
N Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
A Auffrischimpfung

^a die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
^b einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis
^c einmalige Impfung ab 60 Jahre, je nach Gesundheitszustand ggf. Auffrischung
^d Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Immunschutz
^e je nach Impfstoff 2 Impfungen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren, bei Nachholen der HPV-Impfung ab einem Alter von 13 bzw. 14 Jahren 3 Impfungen